

Anti D Rho (D) Immune Globulin

Anti D

Anti D הוא חיסון שמופק מתאי פלסמה אנושיים ומכיל נוגדנים ספציפיים מסוג אימונוגלובולין G. התרופה ניתנת כטיפול למניעת התפתחות נוגדנים לכדוריות דם אדומות מסוג Rh חיובי אצל אנשים עם סוג Rh שלילי. בנוסף, ניתן לחולים עם ITP (Immune thrombocytopenic purpura) כקו טיפול ראשוני בשילוב עם סטרואידים ו/או אימונוגלובולינים.

אופן מתן Anti D

Anti D ניתן בזריקה לתוך השריר או בעירווי ורידי על פי החלטת הרופא.ה המטפל.ת. כאשר הטיפול ניתן ל-IPT, תינתן התרופה בעירווי לתוך הוריד. לפני מתן התרופה, החולה יקבל נוזלים ותרופות הכנה - אקמול וסטרואידים למניעת הופעת אלרגיה. בסיום הטיפול ילדך יישאר להשגחה למשך כחצי שעה.

אחסון התרופה

יש לאחסן את התרופה באריזתה המקורית במקרר בטמפרטורה של 2-8 מעלות צלזיוס.

תופעות לוואי ממתן Anti D

מתן Anti D עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים: עליית חום, סומק בפנים, כאבי ראש, סחרחורת, עלייה בלחץ הדם, כאבי בטן ופגיעה בכליות.

אספקה וקבלת הטיפול

התרופה מסופקת על ידי קופות החולים לאחר המלצת רופא.ה המטולוג.ית מטפל.ת. עליך להביא את התרופה ולהצטייד בטופס 17 לאשפוז יום.

רפואה שלמה
צוות המטו-אונקולוגית ילדים