

טיוגואנין - Thioguanine (LANVIS)

Thioguanine

תרופה כימותרפית המשמשת לטיפול בלוקמיה לימפוציטית חריפה (ALL). התרופה ניתנת בשלב הטיפול האינטנסיבי (רה-אינדוקציה). טיוגואנין משתייכת לקבוצת חומרים הנקראים אנטי-מטאבוליטים, הפוגעים בתאים הסרטניים על ידי הפרעה למחזור החיים של התא.

אופן מתן Thioguanine

התרופה מגיעה בטבליות של 40 mg וניתנת דרך הפה. מינון התרופה יקבע על ידי הרופא. המטפלת. בעת מתן התרופה יש לעטות כפפות על מנת להימנע ממגע ישיר עם העור. התרופה נספגת בצורה יעילה כאשר היא ניתנת על קיבה ריקה, לכן יש ליטול את התרופה בערב, שעתיים לאחר הארוחה. בשעתיים אלו ניתן לשתות מים או נוזל צלול (למשל מיץ תפוחים).
* חשוב לתת את התרופה בשעה קבועה כדי לשמור על רמה קבועה בדם.

מתן Thioguanine בילד שאינו בולע כדורים

- יש לעטות כפפות ומסכה
- להמיס את הכדור במעט מים
- ניתן להוסיף כמות קטנה מאד (לא יותר מכפית אחת) של סירופ בטעם פטל
- לוודא שילדך לוקח את כל התערובת.
- *בתינוקות חשוב לטפל בהפרשות (שתן, צואה וקיא) בכפפות על מנת להישמר מפני מגע עם חומר ציטוטוקסי.

אחסון התרופה

יש לאחסן את התרופה באריזתה המקורית, במקום יבש וקריר (לא במקרר).

תופעות לוואי

- ירידה זמנית בספירות הדם.
- ירידה בכדוריות האדומות העלולה לגרום לאנמיה אשר באה לידי ביטוי בעייפות וחולשה.
- ירידה בטסיות הדם - קיים סיכון לשטפי דם.
- ירידה בכדוריות הדם הלבנות - אשר עלולה לגרום לדיכוי מערכת החיסון וסיכוי מוגבר לזיהומים.
- תופעות לוואי נוספות: פריחה, חוסר תאבון, בחילות, הקאות ושלשולים, עלייה באנזימי כבד שעלולה לגרום לצהבת ולרעילות בכבד.
- נטילת התרופה עלולה לגרום לרגישות לאור השמש, שבאה לידי ביטוי כפריחה או כשינוי בגוון העור. יש להימנע מחשיפה ישירה לשמש עד כמה שאפשר, לכסות את העור ולהשתמש בקרם עם מקדם הגנה גבוה.
- במידה ומופיעים אחד מהסימנים הבאים: חום 38 מעלות ומעלה, שטפי דם, דימומים בלתי מוסברים, תחושת כללית לא טובה, עייפות וחולשה ניכרת יש לפנות בהקדם לרופא. המטפלת.

במהלך הטיפול תגיעו למעקב שגרתי במרפאה לצורך בדיקות דם ובדיקת רופא.

רפואה שלמה

צוות המטו-אונקולוגית ילדים