



דצמבר 20

מידע על מתן חיסוני קורונה למטופלים המטולוגים

- בחולים עם דיכוי חיסוני על רקע ממאירות, דווח על שיעור מוגבר של מחלת קורונה קשה יותר.
- יעילות החיסון בחולים עם ממאירות המטולוגית עשויה להיות פחותה מאוכלוסייה בריאה.
- חיסון בפלטפורמת mRNA הוכח עם שני סוגי חיסון (Pfizer, Moderna) כיעיל במיוחד במניעת Covid 19 קליני בכלל האוכלוסייה. לכן ההמלצה ככלל היא לחסן בחיסון מטופלים מדוכאי חיסון על אף שיתכן והחיסון יהיה פחות יעיל בשל הדיכוי החיסוני.
- מטופלים הנמצאים בטיפול פעיל מתבקשים להתייעץ עם ההמטולוג המטפל לגבי המועד המדויק לקבלת החיסון.
- מטופלים אשר עברו השתלת מח עצם מתורם, טיפול בקארס, או השתלה עצמית ב 3 החודשים האחרונים, מתבקשים להתייעץ עם ההמטולוג המטפל טרם קבלת החיסון.
- יש להמשיך לנהוג בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, כולל עטית מסיכה וריחוק חברתי.
- מומלץ לחסן את בני הבית אשר קיימת התוויה לחסנם.
- יש לתת את החיסון בנפרד מחיסונים אחרים (המלצה על המתנה של 14 ימים לפני / אחרי).
- מטופלים עם תגובה אלרגית: אין לתת את החיסון לאנשים עם היסטוריה של תגובה אנפילקטית (למשל, אנשים שהודרכו להחזיק מזרק EpiPen). לאנשים עם היסטוריה של תגובה אלרגית אחרת מותר לקבל את החיסון. בכל ספק, יש להיוועץ ברופא מומחה לאלרגיה ואימונולוגיה.