



# דף מידע והנחיות בנושא מניעת תגובה אלרגית לחומר ניגוד

בנבדקים בסיכון לתגובה אלרגית

## מטופל/ת יקר/ה שלום!

במידה ובזמן קביעת התור הוחלט כי הינך בסיכון מוגבר לפתח תגובה אלרגית לחומר הניגוד, יש צורך בקבלת טיפול תרופתי לפני ביצוע הבדיקה.  
אנא פנה/י לרופא המטפל שלך עם דף מידע זה **לפחות 4 ימים לפני תאריך הבדיקה** המתוכננת, לצורך קבלת המרשמים לטיפול המתאים לפני הבדיקה.  
במידה והרופא נותן לך טיפול זה, חובה להגיע לבדיקה עם מלווה, מכיוון שהתרופות יכולות לגרום לטשטוש ועייפות. לתשומת ליבך - אסור לנהוג במשך מספר שעות לאחר נטילת פנרגן!

## ♥ מתי יש צורך בטיפול תרופתי לפני הזרקת חומר ניגוד?

כאשר ישנה אלרגיה ידועה לחומר הניגוד (יוד בבדיקות CT, גדוליניום בבדיקות MRI).

## ♥ רופא/ה נכבד/ה:

- במידה וידוע על תגובה אלרגית קשה בעבר לחומר הניגוד אותו מתכננים להזריק (שוק אנפילקטי, דום לב, פרכוסים, בצקת בלוע, הפרעות קצב), יש להתייעץ עם רדיולוג לגבי הצורך בהזרקת חומר הניגוד והסיכון לעומת התועלת.
- במידה ומחליטים שחייבים להזריק חומר ניגוד - יש להתייעץ עם אלרגולוג לקבלת פרוטוקול מיוחד מותאם לנבדק ולתגובה (פרוטוקול ממושך מהרגיל).
- לתשומת ליבך, במידה והמטופל/ת סובלת/ת מ-סכרת, כיב פפטי (נוכחי או בעבר) או שחפת פעילה, מתן סטרואידים עלול להיות בעייתי ולכן יש לשקול את הצורך בהזרקת חומר ניגוד בקפידה.

## ♥ הטיפול התרופתי (הפומי):

- 3 מנות פרדניזון 50 מ"ג - מנה I: 13 שעות לפני הבדיקה.  
מנה II: 7 שעות לפני הבדיקה.  
מנה III: שעה לפני הבדיקה.
- פנרגן 25 מ"ג (promethazine) פומי או תוך שרירי - שעה לפני הבדיקה.

## ♥ מטופלים אשר אינם יכולים לקבל את התרופות במתן פומי:

- 3 מנות הידרוקורטיזון IV 200 מ"ג - מנה I: 13 שעות לפני הבדיקה.  
מנה II: 7 שעות לפני הבדיקה.  
מנה III: שעה לפני הבדיקה.
- פנרגן 25 מ"ג (promethazine) תוך שרירי - שעה לפני הבדיקה.

בברכת רפואה שלמה,

פרופ' אריה בלשר  
מנהל אגף הדימות