

יואינג סרקומה

אתכם לאורך כל הדרך,

בהרכת בריאות שלכם

צוות מציק פאטולוגיה ילדים



VINCRI=V - תרופה כימותרפית הניתנת בעירוי דרך צנתר מרכזי למשך 15 דקות. תרופה זו עלולה לגרום לעצירות ולכן יש להקפיד על שתייה מרובה, אכילה של מזונות עשירים בסיבים תזונתיים. לעיתים ניתן בנוסף תרופות מסייעות, כגון: נורמלקס/ אבילק. התרופה עלולה בנוסף לגרום לכאבים בלסתות, גפיים והפרעות בתחושה.

DOXORUBICIN=D - תרופה כימותרפית שניתנת דרך צנתר מרכזי למשך כ-15 דקות. צבעה של התרופה אדום ולכן יש שינוי בצבע השתן לאדום בימים הסמוכים לטיפול, מדובר בתופעה זמנית וחולפת. התרופה עלולה לגרום לפגיעה בלב ולכן ניתן לפני כל מנה, תרופה נוספת בשם קרדיוקסן שתפקידה להגן על הלב, במקביל נבצע מעקב על ידי בדיקות אקו לב.

CYCLOPHOSPHAMIDE=C - תרופה כימותרפית הניתנת בעירוי דרך צנתר מרכזי למשך כשעה. תרופה זו יכולה לגרום לפגיעה בשלמות רירית שלפוחית השתן שיכולה לבוא לידי ביטוי בדם בשתן. על כן ניתן תרופות המגנות על השלפוחית ונוזלים בכמות רבה במקביל למתן התרופה. בנוסף נבצע מעקב על ידי בדיקות שתן.


IFOSFAMIDE=I - תרופה כימותרפית הניתנת בעירוי דרך צנתר מרכזי במשך שעה. גם תרופה זו בדומה לציקלופוספאמיד עלולה לגרום לפגיעה בשלמות רירית שלפוחית השתן ועל כן נטפל בהתאם.

ETOPOSIDE=E - תרופה כימותרפית הניתנת בעירוי דרך צנתר מרכזי למשך שעה.

* לאחר השחרור מהמחלקה תזמנו לביקורת במרפאתנו לצורך בדיקות דם ובדיקת רופא ובמידת הצורך ינתן טיפול במוצרי דם / נוזלים.
* זריקות ניופוגן \ נאולסטים - ניתנות בהוראת רופא ותפקידם לצמצם את מספר הימים של ספירת דם לבנה נמוכה.
* התרופות הכימוטרפיות גורמות לבחילות ולכן ניתן טיפול בניסיון למזער תחושה זו סביב הטיפול הכימותרפי.
* מרבית התרופות הכימוטרפיות גורמות לנשירת שיער שכמובן עם סיום הטיפול יצמח מחדש.
* כל התרופות עלולות לגרום לתופעות לוואי נוספות כגון חולשה, עייפות, תשישות, ירידה בתאבון, עצירות ושלשולים וכ"ו, יש לדווח לרופא/ אחות על כל בעיה או תחושה שאינה מוכרת
* במהלך הטיפול נבצע בדיקות הדמיה לצורך מעקב ובדיקה של יעילות הטיפול וכן לתכנון הטיפול המקומי - MRI, CT, PET-CT.

המפה טיפולית ניתנת לשינוי לפי המצב הקליני ולפי שיקול דעתו של הרופא המטפל

מפת טיפול - יואינג סרקומה



D = DOXORUBICIN - דוקסורוביצין

V = VINCRISTINE - וינקריסטין

C = CYCLOPHOSPHAMIDE - ציקלופוספמיד

I = IFOSFAMIDE - איפוספמיד

E = ETOPOSIDE - אטופוסיד

IE* 5 ימי טיפול+יום נוזלים (סה"כ כ-6 ימי אשפוז)

VDC 2 ימי טיפול ואשפוז**

VC* יום 1 של טיפול+יום נוזלים (סה"כ כ-2 ימי אשפוז)**

****** טיפול מקומי = קרינה או/ו ניתוח**

******* דוקסורוביצין לא ניתן במקביל לטיפול בקרינה (סה"כ ניתן 5 פעמים)**