



29.06.2026

הוראות לביצוע בדיקת קורטיזול ברוק

נא הקפד על שעת לקיחה כפי שהרופא דרש: לילה = חצות (24:00)

1. יש לקחת את הדגימה שעתיים לאחר אוכל או לקחת תרופה.
2. יש לצחצח שיניים שעה לפני לקיחת הדגימה.
3. עשר דקות לפני לקיחת הדגימה שטוף את הפה מספר פעמים עם מים קרים.
4. יש לפתוח את המבחנה להוציא את גליל צמר הגפן וללעוס במשך 3-5 דקות.
5. יש להכניס את גליל הצמר גפן חזרה לתוך המבחנה האמצעית ולפקוק היטב.
6. נא לרשום על המבחנה הראשית שם, שם משפחה, ת.ז., תאריך ושעת לקיחה.
7. יש להביא את הדגימות למכון האנדוקריני בקומה 13 בנין אריסון, בימים א-ה בין השעות 8:00-12:00.
8. יש להביא תעודת זהות, הפניית רופא, אמצעי תשלום.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למעבדה האנדוקרינית - טל' 03-6973276

פקק, יש לפקוק היטב בסיום התהליך.

גליל צמר גפן, יש ללעוס היטב ולהחזיר למבחנה האמצעית.

מבחנה אמצעית- נא לא לזרוק מבחנה זו.

מבחנה ראשית

בברכה,

צוות המעבדה האנדוקרינית – בית חולים איכילוב

טל': 03-6973276 | פקס: 03-6973421

טל': *8801 | רח' ויצמן 6, תל אביב, 6423906 Tel Aviv, Weizman St. 6

