

פורינטול - Purinethol (6MP)

פורינטול - Purinethol, (המכונה גם 6MP), היא תרופה כימותרפית המשמשת לטיפול בלוקמיה לימפוציטית חריפה (ALL). התרופה ניתנת בשלב הטיפול האינטנסיבי ובשלב הטיפול האחזקתי, משתייכת לקבוצת חומרים הנקראים אנטי-מטאבוליטים הפוגעים בתאים הסרטניים על ידי הפרעה למחזור החיים של התא.

אופן מתן Purinethol

התרופה מגיעה בטבליות במינון של 50mg וניתנת דרך הפה. המינון יקבע על ידי הרופא. המטפלת. בעת מתן התרופה יש לעטות כפפות על מנת להימנע ממגע ישיר עם העור. התרופה נספגת בצורה יעילה כאשר היא ניתנת על קיבה ריקה, לכן יש ליטול את התרופה בערב, שעתיים לאחר הארוחה. במהלך שעתיים אלו ניתן לשתות מים או נוזל צלול (למשל מיץ תפוחים). חשוב לתת את התרופה בשעה קבועה כדי לשמור על רמה קבועה בדם.

מוצרי חלב מקטינים את ספיגת התרופה בדם לכן יש להימנע ממתן חלב ומוצריו שעתיים לפני נטילת התרופה ושעתיים לאחר מכן.

מתן פורינטול בילד שאינו בולע כדורים

- יש לעטות כפפות ומסכה.
 - להמיס את הכדור במעט מים.
 - לערבב את האבקה עם כמות קטנה מאוד (לא יותר מכפית אחת) מים או סירופ בטעם פטל.
 - לוודא שילדך לוקח את כל התערובת.
- בתינוקות חשוב לטפל בהפרשות (שתן, צואה וקיא) בכפפות כדי להגן על עצמכם מפני מגע עם חומר ציטוטוקסי.

אחסון התרופה

יש לאחסן את התרופה במיכל המקורי, במקום יבש וקריר (לא במקרר).

תופעות לוואי ממתן Purinethol

- ירידה זמנית בספירות הדם -
 - ירידה בכדוריות האדומות העלולה לגרום לאנמיה הבאה לידי ביטוי בעייפות וחולשה
 - ירידה בטסיות הדם - קיים סיכון לשטפי דם
 - ירידה בכדוריות הדם הלבנות - העלולה לגרום לדיכוי במערכת החיסון וסיכוי מוגבר לזיהומים
 - תופעות לוואי נוספות: פריחה, חוסר תאבון, בחילות, הקאות שלשולים, עלייה באנזימי כבד, רגישות לאור השמש וירידה ברמת הסוכר בדם. ירידה ברמת הסוכר בדם מתרחשת לרוב בשעות הבוקר המוקדמות לאחר נטילת התרופה בלילה. על מנת למנוע את ירידת הסוכר בדם מומלץ לאכול ארוחת ערב עשירה בפחמימות מורכבות כמו פסטה ולחם. בבוקר יש לצרוך מאכל מתוק (פחמימות פשוטות) כגון עוגה, תה עם סוכר
 - אם מופיעים אחד מהסימנים הבאים: חום 38 מעלות ומעלה, שטפי דם, דימומים בלתי מוסברים, תחושת כללית לא טובה, עייפות וחולשה ניכרת יש לפנות בהקדם לרופא. המטפלת.
- במהלך הטיפול תגיעו למעקב שגרתי במרפאה לצורך בדיקות דם ובדיקת רופא.ה.

רפואה שלמה

צוות המטו-אונקולוגית ילדים