

# דף מידע והנחיות למטפל/ת

דף הסבר והנחיות לקרהת בדיקת קולונוסקופיה בשעות אחיה"צ (15:00-20:00)

## הכנה מוקדם

### מהי קולונוסקופיה?

קולונוסקופיה היא בדיקה נפוצה לצורך אבחון וטיפול במקרים של המעי הגס. את הבדיקה מבצע רופא גסטרואנטולוג באמצעות החדרת אננדוסקופ לפיה הטבעת. האנדוסקופ הוא צינור דק וגמיש (כעובי אצבע) בקצוות יש מצלה וידאו צעירה אשר מאפשרת הסתכלות ישירה אל חלל המעי הגס ומכאן שמה: קולון – מעי, סקופיה – מבט. לבדיקה קולונוסקופיה חשיבות רבה למניעת וגלי מוקדם של סרטן מעי הגס.

הבדיקה הינה איבחונית וטיפולית. במהלך בדיקת הקולונוסקופיה ניתן לבצע פעולות שונות כמו: לקיחת ביופסיה, כריית פוליפ והרחבת המעי במקורה של היצירות.

הבדיקה מתבצעת אחרי מתן זריקת תורן ורידית של תרופה טשטוש, על מנת להפחית ואף לנטרל את תחושת אי הנוחות שבבדיקה, לאחר קבלת הסכמתה בכתב מהנבדק או מהאופטראפום החוקי. מצורפת דוגמא של טופס הסכמה לבדיקה.

### מדוע נדרשת הכנה מיוחדת לבדיקה קולונוסקופיה?

הכנה לבדיקה היא חלק קריטי והכרחי להצלחת הבדיקה והיא באחריותך הבלתי!

מטרת הכנה היא לরוקן את חלל המעי מכל התוכן שיש בו על מנת שניתן יהה לראות היטב את דופן המעי. הכנה לא טוביה תפגום באיכות הבדיקה וביכולת האבחנה ולפעמים תצריך קולונוסקופיה חוזרת. תהליך הכנה נמשך מספר שעות וחיבים להקפיד על כל הוראות הבדיקה.

הכנה מחולקת לשלב התזונה ושלב החומרים המשלשלים. שלב התזונה משותף לכל הנבדקים. שלב המשלשלים משתנה מנבדק לנבדק. קיימים מספר חומרי הכנה והבחירה ביניהם נקבעת ע"י הרופא ע"פ מחלות הנבדק, גילו ונתונים רפואיים אחרים. כל החומרים מחייבים מרשם רפואי.

### כיצד עלי להתכוון לבדיקה?

#### תרופות

- יש לפנות לרופאה המטפל/ת בשבוע לפני הבדיקה על מנת לקבל הנחיות מותאמות באופן אישי, בעיקר עבור טיפול במדללי דם. **נא למסור לרופאה המטפל/ת את דף המידע המצורף בסוף חוברת זו.**
- יש להפסיק נטילת תרופות המכילות ברזל, ביסמוט או פחם 5 ימים לפני הבדיקה
- תרופות עבור יתר לחץ דם או מחלות לב – יש לחתת את התרופות הקבועות בבוקר הבדיקה למורות הצום.
- תרופות עבור סוכרת-אסור להזריק אינסולין או ליטול תרופות לטיפול בסוכרת בבוקר הבדיקה, אך יש להביא את האינסולין עמר. יש להביא גם אוכל לארוחה קלה לאחר הבדיקה.
- תרופות עבור דילול דם – יש לפעול על פי הנחיות הרופאה/המטפל/ת ולבצע בדיקת דם לתקופוד קריישה.
- במידה ואתיה סובלות מעיצרות ומשתמשות בתרופות משלשלות באופן קבוע, עליך להמשיך ליטול את התרופות המשלשלות כרגיל, בנוסף להוראות הכנה.

#### הנחיות נוספת

- חוובה להגיע עם מלאה (אין לנוהג ברכב ביום הבדיקה)
- מומלץ לבוש בגדי נוח ולהמנע מענידת תכשיטים
- יש להציג במכtab הפניה בו מפורטות האבחנות הרפואיות, רשותת תרופות עדכנית וסיבת הבדיקה.
- יש להביא תעודה מזיהה, **תשובה בדיקות דם לסתירה וקרישה מהשבועיים האחרונים** וטופס 17 מתאים

# דף מידע והנחיות למטופף/ת

הוראות ההכנה התזונתית לבדיקת קולונוסקופיה אחה"צ – הכנות מרוקן  
aicot ha-bidka b-idim shelr! na le-krao hiteb at ha-horavot v-le-kafid ul cel ha-shlevim!

## 3 ימים לפני הבדיקה - ארכחות קלות ושתייה מרובה

- ניתן לאכול** - לחם לבן/פיתה/באגט (לא דגנים, שומסום או פרג), פסתה, אורז לבן, קויסקי, מוצר חלב, ביצה, דגים, עוף וופסטרמה, יש להקפיד על כמות קטנות.
- אסור לאכול** – כל סוג הירקות והפירות (טרים, מברשלים או יבשים), מיני גרעינים, אגוזים ושקדים, סיבים תזונתיים וקטניות (שעועית, חומוס, אפונה, עדשים, פול, פולי סוויה), דגנים מלאים, שיבולת שעល, תירס/ופקளן, בשר ברק.

במקרה שיש ספק אין ספק! – אל תאכלו מה שאתם מתלבטים לגבי!

- במהלך היום יש לשותות לפחות 10-8 כוסות של מים
- יש ליטול כדורי לקסדין (LAXADIN) לפני השינה בכל ערב (3 ימים לפני ויוםים לפני הבדיקה)

## יום לפני הבדיקה – כלכלה נזלית בלבד החל מהשעה 00:00 ונטילת משללים

- 12:00 – ארכות צהרים מותאמת לפי תפריט היום הקודם.
- לאחר ארכות הצהרים – ניתן לאכול/לשנות נזלים בלבד:** מים, מיצי פירות מסוכנים (לא חתיכות פרי כמו מיץ תפוחים, מיץ עגבבים וכו'), מרק צח, סודה ומשקאות מוגדים, ג'לי (לא חתיכות פרי), קרטיבים (לא חתיכות פרי), קפה ללא גרגירים/תה לא חלב
- 18:00 – יש להכין את תמייסת המרוקן על-ידי הוספה של 3 ליטרים של מים לאבקה במיל. יש לערבות היטב עד להמסה מלאה ולאחר מכן לחلك לשני חלקים שוים, ולהכניס למרקך. כל חלק כ-6 כוסות.
- 18:00 – נטילת 2 כדורי לקסדין (LAXADIN) (PRAMIN)
- 18:30 – נטילת כדורי מונע בחילה (פרמין) (PRAMIN)
- 19:00-21:00 – תחילת שתיית החלק הראשון של המרוקן 1.5 ליטר תמייסה בקצב של כוס אחת כל 15 דקות. בין המנות מומלץ להמשיך לשמר את התמייסה בקירור. על מנת לשפר את הטעם ניתן להוסיף מיץ לימון טבעי צלולן ללא הגבלה.
- לאחר מכן המשך שתיית נזלים צלולים ללא הגבלה.

## יום הבדיקה

- 5 שעות לפני מועד הבדיקה – נטילת כדורי אחד של פרמין ולאחר חצי שעה, תחילת שתיית החלק השני של המרוקן לפי אוטם כללים (1.5 ליטר בקצב של כוס אחת כל 20-15 דקות). במקביל לשתיית המרוקן עדין מותרת שתיית נזלים צלולים ללא הגבלה.  
(לדוגמא – אם שעת הבדיקה היא 15:00 אחרצה, יש לקחת כדורי פרמין ב00:10 בערך, ולהתחליל לשתוות את החומר ב03:00. יש לשmins את השתייה עד השעה 12:30 בצהרים).
- שעותים לפני הבדיקה – תחילת צום מלא (גם לא לשותות).

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למכון הגסטרו :

טלפון: 03-6974969 פקס: 03-6974460 מייל: Gastro-dep@telvmc.gov.il

# דף מידע והנחיות למטופלים



## כיצד אדע שאנו מוכן לבצע בדיקה?

כאשר ביום הבדיקה היוצאות הן לא רק מימיות אלא גם **ש��ופות כמו מים** – ההכנה בוצעה כהלה. אם לא, מומלץ להשלים חווון (Fleet enema) להכנה טוביה יותר, עד לחזרת מים נקיים.

## מה צפוי להיות במהלך הבדיקה?

- ביום הבדיקה תעביר קבלה ראשונית על ידי המזקירה בכינסה למקום ולאחר מכן הוצאות הסיעודי.
- אם הנך סובל/ת מאלרגיה לתרופה, מחלות מדבקות או מחלת הגורמת לדימום ואם יש לך קוצב לב מלאכותי(PACEMAKER) / או דיפיברילטור עלייך להודיע על כך לאח/ות בזמן הקבלה.
- הנטנה לבדיקה תליה באורך הבדיקה שלפניך שעלולות להתעכב, לכן יש להמתין בסבלנות לתוך (אל דאגה לא שכחנו אותך). זמן השהייה הכלול הצפוי במכון הגסטרו הוא עד 5-4 שעות, נא להעריך בהתאם.

## כיצד להתנהל לאחר הבדיקה?

- לאחר הבדיקה שאורכת בסביבות ה 30 דקות תועבר/י לחדר התאוששות. זמן השהות בחדר ההטאוששות הוא לרוב בין חצי שעה לשעות. שתיה ואכילה בגמר הבדיקה יותר ע"פ הוראות הרופא/ה (רצוי להציג מראוחה קלה כמו קרין).
- לאחר שתמצאי/י כירעה לשחרור, תערך פגישת סיכום עם הרופא/ה המבצע/ת ומתן דוח הבדיקה.
- במידה ונלקחו ממך ביופסיות במהלך הבדיקה את התוצאות תקבל בדיור בין 10-14 ימים.

# דף מידע והנחיות למטופל/ת

## טופס הסכמה: אנדוסקופיה של מערכת העיכול

האנדוסקופ הוא צינור גמיש שבתוכו מצויים סיבים אופטיים, דרכם ניתן לראות, ותעלות דרכן ניתן להעביר מכשירים לצורך קיחת ביופיות, כריתת פוליפים, צריבת נקודות דם, טיפול בדליות והוצאה גוף זר. אורכו של האנדוסקופ נע בין 1.80 - 1.20 ס"מ, והוא עשוי בערטתו לבודק את מערכת העיכול העילונה והתחתונה. בדרך כלל, לפני הבדיקה, מקבל הנבדק תרופות הרגעה /או אלחוש מקומי, על מנת להפחית את תחושת אי הנוחות שביבדיקה.

הבדיקה מבוצעת כאשר הנבדק שוכב על צדו השמאלי. כאשר מדובר בבדיקה של דרכי עיכול עליונות, (אוזוגאסטורקופיה, גסטרוסקופיה)ழוחדר האנדוסקופ דרך פי הפה. כאשר מדובר בבדיקה של דרכי עיכול תחתונות, (סיגמואידוסקופיה, קולונוסקופיה)ழוחדר האנדוסקופ דרך אחוריו.

בஹמשך מוחדרים דרכו מכשירים בהתאם לפעולות הנדרשות. משך הבדיקה נع, בדרך כלל, בין 15 דקות לשעה. במשך הבדיקה קיימת הרגשה של אי נוחות ונפיחות בבטן. שם החולה:

שם משפחה	שם פרטי	שם האב	ת.ז.
אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת שקיבלת הסביר מפורט בעל פה מד"ר			
שם משפחה	שם פרטי	שם האב	ת.ז.
על הצורך בבייעוץ	אבחונית / או טיפולית לרבות	שם הפעולה	
פרט טיפול אחר	לקיחת ביופsie, כריתת פוליפים, צריבת נקודות דם, טיפול בדליות והוצאה גוף זר*. (להלן: "הטיפול העיקרי").	שם הפעולה	

הסביר לי על קיומן של חלופות אבחנות אחרות, יתרון, חסרון, תופעות הלואוי שלחן והסיבות האפשריים. כמו כן, הסביר לי שלמרות שהבדיקה האנדוסקופיתינה הטובה ביותר במקרה היום לגילוי פוליפים וגידולים, הרי שלבדיקה יש מגבלות. הבדיקה מסוגלת לאטר את מרבית הגידולים והפוליפים הגדולים במעי הגס, אך לא את כלם. אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הסבירו לי תופעות הלואוי של הטיפול העיקרי לרבות כאב, אי נוחות ותחושה של נפיחות בבטן. כמו כן, הסבירו לי הסיבות האפשריות לרבות: דימום או קרע של דופן מערכת העיכול, אשר בחלק מהמקרים יצרו תיקון ניטוח. בבדיקה דרכי עיכול עליונות עלול להיגרם נזק לשניים עקב החדרת המכשיר דרך הפה. הסיבות האמורין אינם שכיחים.

אני מודע/ת בזאת את הסכמי לבייעוץ הטיפול העיקרי. כמו כן, אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הסביר לי ואני מבין/ה שקיימת אפשרות שתוך ביצוע הטיפול העיקרי או מיד לאחריו יתרבר שיש צורך להרחיב את היקפו, לשונו או לנוקוט בהליכים אחרים או נוספיםים לצורך הצלת חיים או למניעת נזק גופני, לרבות פעולות כירורגיות שלא ניתן לצפותם בעת בודאות או ממלואם אך משמעותם הובירה לי. לפיכך אני מסכימ/ה גם לאותה הרחבה, שני או ביצוע הליכים אחרים או נוספיםים, לרבות פעולות כירורגיות שלדעת רופאי המוסד ימי חוניים או דורשים במהלך הטיפול העיקרי או מיד לאחריו. הסכמי ניתנת בזאת גם למתן תרופות הרגעה ואלחוש מוקומי לאחר שהסביר לי שהשימוש בתרופות הרגעה עלול לגרום, לעיתים נדירות, להפרעות נשימה ולהפרעות בפעילות הלב בעיקר אצל חוליות לב וחולי מערכת הנשימה, וכן הסיכון האפשרי של תגובה אלרגית בدرجות שונות לחומר המalachsh. אני יודעת/ת ומסכימ/ה לכך שהטיפול העיקרי וכל ההליכים האחרים יעשה בידי מי שהדבר יוטל עליו, בהתאם לנוהלים ולהוראות של המוסד וכי לא הובטה לי שייעשו, ככלם או חלקם, בידי אדם מסוים, ובלבד שייעשו באחריות המקובלת במידה בכפוף לחוק.

שם האופטורופוס (קריבת)	חתימת החולה	שעה	תאריך
אני מודע/ת כי הסביר/i בעל פה לחולה / לאופטורופוס של החולה* את כל האמור לעיל בפירוט הדורש וכי הוא/ היא חתום/ה על הסכמה בפניו לאחר שוכנעתי כי הבינה את הסביר/i במלאם.			
שם הרופאה/ה	חתימת הרופאה/ה	מספר רישוי	

# דף מידע והנחיות למטופל/ת

## לכבוד הרופא/ המטופל/ת,

מטופל/ת ממומפआטך מזמין/ת לביקורת קולונוסקופיה במכוןנו.

### בדרכם המטופל/ת, בדרכם נטילת תרומות כרכינום

- מטופלים עם יתר לחץ דם או מחלות לב
  - ✓ יש ליטול כרגיל גם ביום הבדיקה, למרות הצום.
- מטופלים עם סוכרת
  - ✓ לא ליטול/להזריק תרומות עבורי סוכרת בבוקר הבדיקה.
  - ✓ יש להביא אינסולין וארוחה קלה לשימוש לאחר הבדיקה.
- מטופלים הנוטלים מדללי דם
  - הן הנחיות כליליות להפסקת טיפול בתכשירים השונים. יש להעיר כל מטופל לגופו ולשקל טיפול חלופי מתאים לפי הצורך:
    - ✓ אספירין (על סוגיו השונים) אין צורך להפסיק לפני גסטרוסקופיה שגרתית. במידה ומתקננת כריתת/סימון פוליפ, הרחבות למיניהם, טיפול בליזיר(ארוגן), או קשרית דילoit יש להפסיק את הטיפול שבוע לפני הבדיקה.
    - ✓ נוגדי טסיות מסווג פלאוקס PLAVIX, ברילינטה, אפיינט ודומיהם, יש להפסיק 7 ימים טרם הבדיקה.
    - ✓ נוגדי קרישא מסווג קוומאדין COUMADIN,SINTROM יש להפסיק 5 ימים טרם הבדיקה ולבצע בדיקת דם-תפקודי קרישא(INR) يوم טרם הבדיקה.
    - ✓ נוגדי קרישא חדשים מסווג קסרטלו XARELTO,אליקוויס ELIQUIS, פרדקסה PRADAXA יש להפסיק לכל הפחות 48 שעות טרם כל בדיקה אננדוסקופית.
    - ✓ קלקסון CLEXAN יש להזריק עד 12 שעות לפני הבדיקה המיעדת יש להפסיק נטילת תרומות המכילות ברזל, ביסמות או פחות 5 ימים לפני הבדיקה במקורה של שימוש קבוע במשלשלים יש להמשיך ליטול את התרומות המשלשלות כרגיל, בנוסף להוראות ההכנה.

### נא לצד את המטופל/ת במסמיכים המתאימים

- מכתב הפניה בו מפורטות האבחנות הרפואיות, רשימת תרומות עדכנית וסיבת הבדיקה. יש לוודא שבכתב מצוינות גם ריגשות לתרומות, מחלות מדבקות או מחלות הגורמות לדם וכן במידה ולמטופל יש קוצבל לב מלאכותי(PACEMAKER) ו/או דיפרילטור
- **תשובה בבדיקות דם עדכניות למספרת דם ותפקודי קרישא עד שבועיים ממועד הבדיקה**
- מסמכים אודות בדיקות קודמות רלוונטיות
- **המרשם הבא כמפורט:**

שם תרופה	יחידה זמן	משך	תדירות	אופן מתן	מיןון
MEROKEN 3L	.1	יום	חד פעמי	PO	1
PRAMIN 10MG	.2	יום	פעמיים	PO	2
LAXADIN 5MG	.3	ימים	פעם ביום	PO	2
FLEET ENEMA	.4	יום	חד פעמי	PR	1

בסיום הבדיקה המטופל יקבל דוח מפורט בכתב המלצות להמשך טיפול ומעקב.  
ברכה,

המכון למחלות דרכי העיכול והכבד

מרכז רפואי סוראסקי תל אביב

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למכון הגסטרו :

טלפון: 03-6974460 פקס: 03-6974969 מייל: Gastro-dep@tivmc.gov.il